

ISTRUZIONE OPERATIVA 3

Valutazione multidimensionale / Definizione PAI

La valutazione viene effettuata a domicilio dai componenti della Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM): Medico Referente ADI- Medico Medicina Generale- Infermiere- Psicologo- Assistente Sociale. Si utilizzano apposite schede che esplorano le aree Sanitaria, Cognitiva, Funzionale e Sociale, al fine di valutare il bisogno assistenziale attraverso Scale scientificamente validate.

AZIONE	SCOPO	CHI LA COMPIE
VALUTAZIONE SANITARIA comprende Anamnesi clinico- farmacologica Scheda di assistenza infermieristica Codifica delle Patologie ICPC Indice di Comorbidità : Cumulative Illness Rating Scale (CIRIS) Prevenzione e trattamento decubiti : Scala di Exton Smith	Valutare le specifiche condizioni del paziente che necessita di assistenza. Individuare la copresenza di stati morbosi e definirne l'entità. Identificare la presenza di lesioni da decubito o eventuali condizioni di rischio	Medico Infermiere
VALUTAZIONE COGNITIVA utilizza Scala Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ)	Valutare lo stato cognitivo del paziente	Medico
VALUTAZIONE FUNZIONALE comprende la valutazione delle attività di base e della mobilità ; utilizza Scala di Barthel	Valutare le autonomie funzionali	Infermiere
VALUTAZIONE SOCIALE comprende la descrizione del nucleo familiare la situazione abitativa la situazione economica la valutazione complessiva	Descrivere lo stato sociale del paziente e il suo ambiente di vita oltre al supporto della rete sociale (famiglia, privato ,vicinato, volontariato).	Assistente Sociale
DEFINIZIONE DEL PAI Natura del bisogno Durata del Piano Obiettivi Prestazioni	Individuare possibili risposte ai bisogni evidenziati e pianificare le attività e le prestazioni da effettuare	Tutti i componenti della UVM