



ICD-10: Settore XX - CAUSE ESTERNE DI MORBOSITÀ E MORTALITÀ (V01-Y98)

CATEGORIA: SUICIDIO E AUTOLESIONE INTENZIONALE (X60-X84)

STATISTICA DESCRITTIVA

A) I CASI DI MORTE: ASL (metà periodo 2012-14) e Italia (2012)

Genere	Morti (d) di X60-X84		X60-X84: Quoziente di mortalità (X 10.000)		RPM: % di X60-X84 sul totale delle malattie (A00-Y89)	
	ASL (2012-14)	Italia 2012	ASL	Italia	ASL	Italia
♀	2	933	0,1	0,3	0,1 %	0,3 %
♂	34	3324	2,3	1,2	2,2 %	1,1 %
♂ + ♀	36	4257	1,2	0,7	1,3 %	0,7 %



B) I CONFRONTI:

- a. Indicatore utilizzato: SMR
- b. Popolazione standard: popolazione Italia metà periodo 2012
 - c. Distribuzione ipotizzata dei casi X60-X84: tipo Poisson
- d. Livello prefissato di α per il calcolo dei Limiti di Confidenza: 5 %
- e. Tipo di confronto: per residenza (ASL verso Italia) e genere
- f. Denominatore: popolazione a rischio (residenti) a metà periodo: 2012 (per l'Italia) e 2012-14 (per la ASL)
- a. Risultato della **valutazione delle stime degli SMR per X60-X84**: ♀: basso, “**differenza NON significativa**”; ♂ e ♂ + ♀: alto, “**differenza significativa**”.

Suicidio e autolesione intenzionale (X60-X84): SMR e Limiti di Confidenza ASL (metà periodo 2012-14) verso Italia (2012)					
Genere	LCI	SMR	LCS	Valutazione della differenza	
♀	4,8	40	144,5	↓	Non Significativa
♂	130,8	189	264	↑	Significativa
♂ + ♀	105,3	157	216,7	↑	Significativa