



ICD-10: Settore XI - MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE (K00-K93)

CATEGORIA: CIRROSI, FIBROSI ED EPATITE CRONICA (K70, K73-K74)

STATISTICA DESCRITTIVA

A) I CASI DI MORTE: ASL (metà periodo 2012-14) e Italia (2012)

| Genere | Morti (d) per K70, K73-K74 | | K70, K73-K74: Quoziente di mortalità (X 10.000) | | RPM: % di K70, K73-K74 su Malattie apparato digerente (K00-K93) | | RPM: % di K70, K73-K74 su tutte le cause (A00-Y89) | |
|--------|----------------------------|-------------|---|--------|---|--------|--|--------|
| | ASL (2012-14) | Italia 2012 | ASL | Italia | ASL | Italia | ASL | Italia |
| ♀ | 11 | 2549 | 0,7 | 0,8 | 19,6 % | 21,4 % | 0,8 % | 0,8 % |
| ♂ | 52 | 3870 | 3,5 | 1,3 | 59,8 % | 33,6 % | 3,3 % | 1,3 % |
| ♂ + ♀ | 63 | 6419 | 2,1 | 1,1 | 44,1 % | 27,4 % | 2,2 % | 1,0 % |



B) I CONFRONTI:

- a. Indicatore utilizzato: SMR
- b. Popolazione standard: popolazione Italia metà periodo 2012
- c. Distribuzione ipotizzata dei casi K70, K73-K74: tipo Poisson
- d. Livello prefissato di α per il calcolo dei Limiti di Confidenza: 5 %
- e. Tipo di confronto: per residenza (ASL verso Italia) e genere
- f. Denominatore: popolazione a rischio (residenti) a metà periodo: 2012 (per l'Italia) e 2012-14 (per la ASL)
- a. Risultato della **valutazione delle stime degli SMR per K70, K73-K74**: ♀: basso, “**differenza NON significativa**”; ♂ e ♂ + ♀: alto, “**differenza significativa**”.

| Cirrosi, fibrosi ed epatite cronica (K70, K73-K74): SMR e Limiti di Confidenza ASL (metà periodo 2012-14) verso Italia (2012) | | | | | |
|---|-------|------------|-------|------------------------------|----------------------|
| Genere | LCI | SMR | LCS | Valutazione della differenza | |
| ♀ | 42,2 | 85 | 151,4 | ↓ | Non Significativa |
| ♂ | 184,9 | 248 | 324,7 | ↑ | Significativa |
| ♂ + ♀ | 137,2 | 179 | 230,5 | ↑ | Significativa |